



Недоношений < 32 тижнів

Помістіть неосушеним у кювет/пластикову обгортку+ джерело тепла

Вдихуваний кисень (≥ 32 тижнів 21%)
28-31 тижнів 21-30%
<28 тижнів 30%

Почніть з 25 см H₂O

Прийнятний передпротоковий SpO₂

2 хв 65%
5 хв 85%
10 хв 90%

ТИПРІЙТЕ КИСЕНЬ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ САТУРАЦІЇ

(Аntenатальне консультування)
Командний брифінг та перевірка обладнання

Народження
Відстрочка пере тискання пуповини якщо можливо

Запустіть годинник або відмітьте час
Осушіть/загорніть, стимулюйте, тримайте в теплі

Оцініть тони, дихання, ЧСС

Якщо дихання неадекватне:
Відновіть прохідність дихальних шляхів
Недоношений - розгляньте СРАР

Якщо Гаспінг або не дихає:
Зробіть 5 вдихів (30 см H₂O) застосуйте SpO₂ +/-ЕКГ

Переоцініть
Якщо ЧСС не наростає, перевірте рухи грудної клітки

Якщо грудна клітка не рухається перевірте маску, положення голови і нижньої щелепи
2 рятівники (Санация/Ларингеальна маска/ETT)
Розгляньте збільшення тиску вдиху
Повторіть 5 вдихів

Переоцініть
Якщо ЧСС не наростає, перевірте рухи грудної клітки

Якщо є рухи грудної клітки продовжуйте вентиляцію

Якщо скорочення серця відсутні/дуже повільні (<60хв-1) після 30 сек вентиляції
Координуйте:
Координуйте 3 компресії грудної клітки до 1 вдиху
Збільшіть кисень до 100%
Розгляньте інтубацію, якщо вона не виконана раніше (або ларингеальну маску якщо інтубація не можлива)

Переоцініть
Перевіряйте ЧСС кожні 30 секунд

Якщо скорочення серця відсутні/дуже повільні
судинний доступ та ліки
Розгляньте інші причини: напр. пневмоторакс, гіповолемія, вроджені вади

Інформуйте батьків та проведіть командний де брифінг
Завершіть документацію

ПРИБЛИЗНО 60 СЕКУНД

ПІДТРИМУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ

ВЕСЬ ЧАС ПИТАЙТЕ- ВАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА?