

1. Prepreči in bodi pripravljen

- Spodbujaj kardiovaskularno preventivo
- Promoviraj izobraževanja, da se skrajša čas med nastankom težav in prvim stikom z zdravstvenim sistemom
- Promoviraj TPO, da se poveča število očividcev, ki pričnejo z oživljanjem
 - Zagotovi primerne vire za izvajanje programov
- Izboljšaj nadzor kakovosti in kazalce za boljše nadziranje kakovosti

2. Prepoznava znakov za koronarno trombozo & aktivacija protokola za akutni miokardni infarkt z dvigom veznice ST

- Bolečina v prsih pred zastojem
 - Znana koronarna bolezen
 - Začetni ritem: VF/VT brez utripa
- 12-odvodni EKG po reanimaciji kaže dvig veznice ST

3. Oživljaj in zdravi vzroke

Bolniki z obstojnim ROSC

STEMI-bolnik
Čas od diagnoze do PCI
<120 min
Aktiviraj PCI-laboratorij in bolnika prepelji tja
>120 min
Izvedi trombolizo izven bolnišnice in prepelji bolnika v PCI center

Ne-STEMI-bolnik
Odločitev naj bo individualna in temelji na lastnostih bolnika, okoliščinah zastoja in EKG-najdbah
Hitra diagnostika
Izključi nekoronarne vzroke za bolečino v prsih
Ali ishemija vztraja in/ali je bolnik hemodinamsko ogrožen
DA - takoj PCI
NE - razmisli o odloženi PCI

Neobstojni ROSC

Oceni okoliščine, bolnikovo stanje in možnosti
Če je nesmiselno:
razmisli o končanju KPO
Če je smiselno:
Razmisli o transportu do PCI z oživljanjem med prevozom
Razmisli o oživljanju s pomočjo mehanske naprave ali zunajtelesnem ECPR
Razmisli o PCI